

Уважаемый пациент! Вам предстоит операция **под общей анестезией**, и для подготовки к ней важно пройти ряд лабораторных и инструментальных исследований, результаты которых необходимы Вашему лечащему врачу.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
Наименование	Срок действия	Примечание
Общий (клинический) анализ крови развернутый	не более 10 дней	
Общий анализ мочи		
Биохимическое исследование крови: глюкоза, общий и прямой билирубин, общий белок, мочевина, АЛТ, АСТ, калий, натрий, креатинин, холестерин		
Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, МНО, фибриноген)		
Кровь на RW	Не более 1 месяца	
Группа крови, резус фактор	бессрочно	
Определение антигена к вирусу гепатита В	не более 3 месяцев	
Определение антигена к вирусу гепатита С		
ИФА диагностика крови на ВИЧ		
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
Флюорография	1 год	
ЭКГ	не более 1 месяца	
ЗАКЛЮЧЕНИЯ		
Врача-терапевта о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для проведения оперативного вмешательства с использованием общей анестезии; смежных врачей-специалистов (по показаниям).		
Консультация врача-анестезиолога (накануне операции).		

*Любое из перечисленных исследований, кроме флюорографии, можно выполнить в NEO-Clinic за 1-2 дня до планируемого оперативного лечения.*

**Вы завершили обследование и готовы к операции. Напоминаем Вам:**

- операция проводится натощак, последний прием пищи и жидкости должен быть накануне, вечером; утром – ничего не есть и не пить!
- операция не проводится во время менструации, за 3 дня до менструации и после; в период обострения хронических заболеваний, острых респираторных инфекций;
- после амбулаторных операций Вы не сможете управлять автомобилем и нуждаетесь в сопровождении;
- за две недели до операции необходимо прекратить курить, а также отменить прием кроверазжижающих средств, по согласованию с терапевтом/лечащим врачом;
- перед операцией необходимо тщательно помыть голову и лицо, не пользоваться косметическими и тональными средствами;
- если носите контактные линзы, то в день операции их необходимо снять;
- накануне операции необходимо принять внутрь таблетки транексамовой кислоты, если не противопоказано по состоянию здоровья, в дозировке 250 мг - 4 таблетки утром и вечером (для профилактики кровотечения).

Уважаемый пациент, за несколько дней до операции с Вами свяжется персональный ассистент по вопросам подготовки, проведения операции и, в том числе, по послеоперационному сопровождению, тел: +7 919 936 09 05.

Если ранее у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к персональному ассистенту, который обязательно поможет с их решением на всех этапах подготовки, чтобы все проходило легко и комфортно.